

## علائم و نشانه‌های سپسیس در نوزادان ممکن است شامل:

- تب یا دمای پایین بدن
- ضربان قلب سریع یا آهسته
- تنفس سریع یا تنگی نفس
- استفراغ
- اسهال
- مشکل در تغذیه و مکیدن نوزاد در شیر خوردن
- متورم شدن شکم
- سرد بودن دست و پاهای نوزاد
- پوست رنگ پریده
- زردی پوست و سفیدی چشم نوزاد (یرقان)
- کاهش فعالیت
- تشنج

## علل عفونت خونی چیست؟

در بسیاری از موارد علت عفونت خونی نوزادی، باکتری‌ها هستند که در طی بارداری و یا در زمان زایمان از مادر به جنین یا نوزاد منتقل می‌شود

بعضی از عوارض دوران بارداری که شانس

بروز عفونت در نوزاد را افزایش می‌دهند

شامل:

خونریزی

تب مادر

عفونت رحمی یا جفتی

پارگی زودرس کیسه آب در طی زایمان

## عفونت خون (سپسیس)

سپسیس نوزادی می‌تواند هر نوزادی را تحت تاثیر قرار دهد. اما نوزادان نارس بیش‌تر از نوزادان ترم دچار عفونت خونی در نوزادان می‌شوند. زیرا سیستم ایمنی آن‌ها هنوز بالغ نشده است. نوزادانی که نارس به دنیا می‌آیند، فاقد آنتی بادی مورد نیاز برای محافظت از خود در برابر برخی از باکتری‌ها هستند.

عفونت خونی یک اورژانس پزشکی به حساب می‌آید و نوزاد شما نیاز به درمان فوری با آنتی بیوتیک دارد که اگر به موقع تشخیص داده نشود می‌توند منجر به بروز شوک و ناتوانی دائمی و یا مرگ شود.

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

استان آذربایجان غربی

مرکز آموزشی درمانی جامع زنان کوثر



## عفونت خون (سپسیس)

واحد آموزش به بیمار

منبع : کتاب نلسون

تایید کننده: دکتر حیدر پور

تاریخ تدوین: بهار ۱۴۰۳

## درمان

وجود عفونت خونی و یا حتی شک به آن در نوزادان مستلزم مراقبت های ویژه و انجام اقدامات درمانی در بیمارستان می باشد.

معمولا پزشکان سپسیس نوزادان را با تجویز آنتی بیوتیک شروع می کنند حتی قبل از اینکه تشخیص تایید شود .

در صورت لزوم ممکن است نوزادان سرم دریافت کنند تا بدن آنها دچار کم آبی نشود. همچنین برای کمک به تنفس کودک ممکن است از دستگاه تنفس مصنوعی استفاده شود.

## چه زمانی باید نوزاد را به اورژانس منتقل کرد؟

. نوزاد شما به طور غیر عادی تحریک پذیر یا خواب آلوده تر از حد معمول است.

- پوست کودک شما سرد و رنگ پریده است یا تغییر رنگ داده است.
- نوزاد شما بیش از ۱۲ ساعت پوشک خشک داشته است.

- کودک شما واکنشی نشان نمی دهد یا در تنفس مشکل دارد

## برای پیشگیری از عفونت خونی در نوزادان چه کارهایی انجام دهید؟

- بهداشت را به خوبی رعایت کنید.
  - شستن دستها به صورت منظم بهترین راه برای جلوگیری از عفونت است.
  - به طور منظم به پزشک خود مراجعه کنید.
  - واکسن های توصیه شده خود را دریافت کنید.
  - علائم سپسیس را بشناسید.
- در صورتی که فکر می کنید که نوزاد شما دارای سپسیس است، به سرعت به پزشک مراجعه کنید.

## تشخیص

- آزمایش خون
- آزمایش ادرار
- نمونه برداری از مایع مغزی - نخاعی
- عکس برداری به خصوص از قفسه سینه