

کanser واژن

مهبل یا واژن لوله عضلانی است که رحم را به دستگاه تناسلی خارجی متصل مینماید. کانسر واژن کانسر بسیار نادری است به گونه ای که کم تر از دو درصد از همه بیماری های زنان را شامل می شود .

علائم

کanser واژن در مراحل اولیه ممکن است هیچ نشانه ای نداشته باشد ولی با پیشرفت آن ممکن است علائم زیر را از خود بروز دهد:

- خونریزی غیرطبیعی پس از رابطه جنسی، بین پریودها و یائسگی
- ترشح آبکی واژن
- ادرار مکرر و دردناک
- یبوست
- وجود توده و درد در لگن و واژن
- خارش و سوزش واژن
- وجود زخم هایی در قسمت خارجی واژن که ممکن است با عفونت همراه باشد

عوامل خطر

- ❖ سن بالای ۶۰
- ❖ داشتن عفونت با HPV یا پاپیلوما ویروس از عوامل خطر سرطان واژن است
- ❖ قرار گرفتن در معرض داروی پیشگیری از سقط جنین بنام (DES)
- ❖ داشتن شرکای جنسی متعدد
- ❖ تجربه اولین مقاربت در سن پایین
- ❖ سیگار کشیدن
- ❖ ابتلا به عفونت HIV

پیشگیری

روش مطمئن برای پیشگیری وجود ندارد با این حال موارد زیر میتواند کمک کننده باشد:

- انجام معاینات منظم لگن و تست پاپ اسمیر
- در مورد دریافت واکسن HPV با پزشک خود مشورت کنید
- عدم استفاده از دخانیات

آزمایشات تشخیصی

- کولپوسکوپی : بررسی واژن با استفاده از ابزار ذره بین مانند و با بزرگ نمایی بیشتر
- بیوپسی یا نمونه برداری: معمولاً در طول کولپوسکوپی جهت بررسی بیشتر نمونه برداری از بافت که به نظر مشکوک باشد انجام شده و به آزمایشگاه ارسال میشود.

روش های درمانی

گزینه های درمانی شما برای کانسر واژن به عوامل مختلفی از جمله نوع کانسر واژن و مرحله آن بستگی دارد.

شما و پزشکتان بر اساس اهداف درمانی خود و پیامدهای جانبی که متحمل آن می شوید ، در کنار هم تصمیم گیری می کنید تا بتوانید تعیین کنید که بهترین روش های درمانی برای شما کدام است. درمان کانسر واژن معمولاً شامل جراحی و پرتو درمانی است.

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

استان آذربایجان غربی

مرکز آموزشی درمانی جامع زنان کوثر



کanser واژن

واحد آموزشی به بیمار

منبع: MAYOCLINIC سایت علمی

تایید کننده: دکتر ایت الهی

تاریخ بازنگری: بهار ۱۴۰۳

با رعایت بهداشت فردی و استفاده از مواد
شستشوی واژینال می توانید از ایجاد عفونت در
این نواحی جلوگیری کنید.



عمل جراحی

عمل جراحی اغلب تنها تومور و یک ناحیه کوچک از بافت سالم اطراف آن برداشته میشود ولی گاهی پزشک ممکن است بسته به اندازه تومور و میزان پیشرفت آن ممکن است جراح برداشتن رحم، تخمدان ها و یا غدد لنفاوی مجاور را نیز توصیه کند.

پرتودرمانی

در این روش از پرتوهای پرنرژی اشعه ی ایکس برای از بین بردن سلول های سرطانی استفاده می شود پرتو درمانی شایع ترین درمان در تمام مراحل سرطان واژن است

شیمی درمانی

روشی است که در آن از مواد شیمیایی برای از بین بردن سلول های سرطانی استفاده می کنند معمولا از شیمی درمانی به تنهایی برای درمان این نوع سرطان استفاده نمی شود.