

## کیست تخدان


کیست های تخدانی، کیسه های پر از مایع در داخل و یا روی سطح یک تخدان هستند. خانم ها دارای دو تخدان هستند که هر کدام به اندازه یک بادام است که در طرفین رحم واقع شده اند. تخمک ها در تخدان ها بوجود آمده و در حین یک سیکل ماهیانه در سالهای تولید مثل خانم ها، بالغ می شوند. بسیاری از خانم ها، در زمانی از زندگیشان کیست های تخدانی دارند. بیشتر کیست های تخدانی ایجاد ناراحتی برای خانم ها نمی کنند و اکثر اینها ضرر هستند.

## علل

علل بیماری بیشتر کیست های تخدانی در طول کارکرد نرمال چرخه قاعدگی شما درست می شوند. نام آنها کیست های فونکسیوں functional است. سایر انواع کیست های تخدان شیوع کمتری دارند.

### نمانه های کیست تخدانی عبارتند از:

- احساس سیری زود رس و نفخ شکم
- مو های زائد و پر موئی-نامنظمی در سیکل های قاعده ای
- درد لگنی: یک درد مداوم و یا متنابه لگنی حین رابطه جنسی
- درد حین اجابت مزاج و یا فشار روی روده ها به قسمت تحتانی پشت شما و ران های شماتیک را بکشد.
- احساس پری و سنگینی در زیر دل
- درد لگنی حین رابطه جنسی
- درد حین اجابت مزاج و یا فشار روی روده ها



- احساس پری و سنگینی در زیر دل
- احساس تکرر ادرار و یا تخلیه نا کامل ادرار بر اثر فشار روی مثانه

علائم بیماری بیشتر کیست ها، هیچ نمانه ای ایجاد نمی کنند و خود به خود برطرف می شوند. یک کیست تخدانی بزرگ می تواند سبب درد شکمی شود

اگر کیست روی مثانه فشار وارد بیاورد، ممکن است احساس تکرر ادرار به فرد دست بدهد

## مرکز آموزشی درمانی جامع زمان کوثر



### کیست تخمدان

واحد آموزش به بیمار

منبع : کتاب بارداری و زایمان

تاریخ بازنگری: بهار ۱۴۰۳

### رژیم غذایی

- کاهش دریافت کالری
- کاهش دریافت کربوهیدرات: نان، برنج، ماکارونی، سبب زمینی
- افزایش دریافت غذاهای غنی از فیبر مانند: سبزیجات ، میوه ها ، حبوبات
- دریافت چربی های اشباع را محدود کنید
- تا حد امکان غذاهای تازه مصرف کنید و از مصرف غذاهای نمک سود شده و کنسروی و دودی خودداری کنید.



### تست ها و روش های تشخیصی کیست تخمدان

کیست های تخمدان شما ممکن است حین معاينه لکنی یافت شود. اگر پزشک به وجود کیست مشکوک باشد، اغلب تست هایی را برای تعیین دقیق وجود آن و نوع آن درخواست می کند . پزشک به سایز کیست و محتوای داخلی آن (جامد یا مایع یا مخلوط) به منظور درمان کیست توجه می کند.

کیست های پراز مایع معمولا سرطانی نیستند. ولی کیست های پرشده از مواد جامد و یا مخلوط جامد و مایع احتیاج به آزمایشات بعدی برای تعیین وجود سرطانی بودن کیست دارند.